LÉSPIDOPTÈRES NOUVEAUX DE LOJA ET ENVIRON,

par Paul Dognin.

Eresia Cerquita n. sp.

55 millimètres. Dessus des quatre ailes d'un blanc opaque saupoudré de fines écailles noires; nervures noires; les supérieures entièrement bordées de noir; les inférieures également bordées de noir à la côte et le long du bord terminal (cette bande terminale plus large que celle des supérieures, possède un point blanc à l'apex) ont le bord abdominal d'un roux ferrugineux.

Dessous comme le dessus, mais la partie blanche moins chargée d'atomes noirs et la bande terminale des quatre ailes possédant une série de points blancs.

Palpes droits velus, à dernier article effilé, noirs bordés de blanc. Antennes noires, la massue d'un roux ferrugineux; tête et thorax noirs; l'abdomen manque malheureusement.

Un spécimen pris en 1890 dans les environs de Loja.

Cette même espèce se trouve au British Museum dans la collection Hewitson, sans nom.

Eucereon Casca n. sp.

34 millimètres. Dessus des supérieures noir brun avec deux taches blanches : une cellulaire, petite, à peu près carrée et une extracellulaire, plus large, ovale, allant de la côte à la 2e (un peu avant le bord terminal).

Nervures en partie jaunes, trois lignes internervurales jaunes entre la sous médiane et la 2, enfin une ligne subterminale également jaune. Dessus des inférieures blanchâtre avec les bords enfumés. Franges grises.

Dessous des supérieures gris noirâtre avec les deux taches blanches comme en dessus. Dessous des inférieures plus blanc que le dessus, les bords également noirâtres.

Palpes et antennes (pectinées) d'un noir brun; front de même teinte au centre, jaune sur le côté; thorax noir brun, ptérygodes noires bordées de jaune intérieurement; dessus de l'abdomen noir avec une tache blanchâtre à la limite du thorax; anus garni d'un petit pinceau de poils, jaunes sur le côté; dessous du corps noir brun avec une tache ventrale blanche sur les premiers anneaux; pattes également d'un noir brun.

Deux ♂ et une ♀; Loja, 1890 et 1893.

Cette description est faite sur celui des deux ♂ le mieux dessiné.

Le second ♂ a les ailes plus sombres, le corps plus noir, les dessins jaunes moins étendus, la tache cellulaire à peine visible mais par contre l'anus entièrement jaune. La ♀, assez défraîchie, ne semble pas varier.

Cette espèce a une grande analogie de dessins avec l'*Eucereon Thalassica* de Felder auprès duquel elle vient se ranger.

Eucereon Zamorae n. sp.

40 millimètres. Dessus des supérieures blanc semé de points d'un gris noir. Ces points, à peu près disposés comme dans l'*Eucereon Aoris* de Moeschler sont plus gros ; ils forment une sorte de double ligne basilaire, de triple ligne centrale, pour finir par une rangée subterminale. Frange blanche coupée de gris.

Dessus des inférieures gris noirâtre à centre plus pâle ; frange concolore.

Dessous des quatre ailes gris noirâtre ; les supérieures avec trois taches blanches : une petite, cellulaire ; une seconde, double, extérieurement à la cellule, enfin une troisième, plus grande, également double, sur le bord terminal entre la 4 et la 2. Frange concolore coupée de blanc aux premières ailes.

Palpes grêles, gris ; antennes (finement crénelées) et thorax, gris ; dessus de l'abdomen rose ; extrémité de l'anus grise ; dessous du corps d'un blanc rosé ; pattes blanches en dessous, grises en dessus.

Une ♀, prise en juin 1893 dans la vallée de la Zamora, près Loja.

Neritos Babosa n. sp.

40 millimètres. Supérieures légèrement falquées à l'apex, le dessus gris café au lait avec trois petits points noirâtres vers la base, une ombre cellulaire et immédiatement au delà de la cellule, touchant la côte, une large tache vitreuse, opaque, arrondie intérieurement, émettant deux petites pointes extérieurement. Frange concolore, coupée de blanc ainsi que le dernier tiers de la côte.

Dessus des inférieures gris noirâtre uni avec quelques poils rosés au bord abdominal et une tache arrondie, blanche, extérieure à la cellule. Frange grise à extrémité blanche.

Dessous des quatre ailes gris noirâtre, la base plus pâle et légèrement rosée, les taches comme en dessus, très nettes.

Palpes café au lait à dessus rosé ; antennes (malheureusement incomplètes) pubescentes, à base rosée ; front, cou et thorax café

au lait; dessus de l'abdomen rose, dessous gris noirâtre, marqué d'une bande blanche en fer à cheval; dessous du thorax et base de la première paire de pattes rosés; milieu des pattes gris noirâtre, extrémité blanche.

Une ♀, El Monje près Loja, 1894.

Pseudopistosia Trama n. sp.

51 millimètres. Ailes semi-transparentes, les supérieures fauve pâle avec les nervures bien marquées; les inférieures plus claires et plus transparentes. Franges concolores. Dessous semblable au dessus.

Palpes grêles, allongés; antennes malheureusement incomplètes (la base est pectinée). Corps court, ne dépassant pas les ailes, uniformément fauve ainsi que les pattes et la tête.

San Francisco près Loja; une ♀ prise en août 1886.

Dirphia Gaujoni n. sp.

61 millimètres. Port de *Pomona* Feld. Dessus des supérieures mousse jaunâtre, coupé par une série de bandes et lignes transversales, droites, d'un lilacé pâle. Ces dessins se décomposent ainsi : une tache basilaire, une fine ligne extrabasilaire, une bande centrale toute droite, bien délimitée de chaque côté par une ombre plus foncée et possédant le point cellulaire noir, une fine ligne extracellulaire, sinuée, enfin une bande subterminale. Frange rougeâtre.

Dessus des inférieures rouge brique terne avec une tache anale lilacée. Frange jaune mousse.

Dessous des quatre ailes jaune rougeâtre, les supérieures avec le point cellulaire, une fine ligne extracellulaire à peine marquée, et suivie de près par une seconde ligne mieux dessinée et sinueuse. Inférieures possédant également un petit point cellulaire et deux fines lignes comme les supérieures.

Antennes bien pectinées; thorax teinté comme le dessus des premières ailes; dessous du corps jaune rougeâtre, pattes lilacées à extrémité rougeâtre.

Un ♂, El Monje, près Loja, 1893.

Trabala Druceioides n. sp.

33 millimètres. Cette espèce, tout à fait voisine de *Trabala Drucei* Schs., s'en distingue par une taille plus grande, sa teinte plus foncée et moins unie, enfin par ses palpes aussi courts mais à

dernier article plus obtus. Ses ailes sont d'un fauve ochracé avec la ligne aux supérieures comme dans *Drucei* c'est-à-dire prenant naissance vers la base du bord interne et traversant toute l'aile avec une légère inflexion pour aboutir à la côte immédiatement avant l'apex. De chaque côté de cette ligne se distinguent, peu visibles d'ailleurs, une seconde et troisième ligne parallèles, la base de l'aile étant marquée de quelques traits. Franges, corps et dessous des ailes concolores, ces dernières de teinte toute unie.

Antennes bien pectinées.

Loja et El Monje; trois ♂, l'un pris en novembre 1887.

Acanthodica Chiripa n. sp.

38 et 40 millimètres. Dessus des supérieures gris terreux marqué de divers dessins et lignes noirs, savoir : un point basilaire, une tache extrabasilaire, arrondie, trois taches centrales séparées, une coudée, une subterminale, enfin le long du bord terminal, une série de taches intranervurales. Frange concolore, bien festonnée de la 1 à la 4.

Dessus des inférieures blanc pur brillant avec une petite tache anale noire et un fin liséré terminal noir, d'ailleurs partiel. Frange blanche, noircie en face de la tache anale. Dessous des supérieures blanchâtre avec la côte, les nervures et le bord terminal (ce dernier marqué d'une série de points noirs) fauves. Frange fauve tachée de noir. Dessous des inférieures blanc brillant, avec la côte, les nervures et la frange teintées de jaunâtre, un point central et une série de fines taches nervurales noires, enfin quelques points terminaux noirs. La frange est noire à l'emplacement de la tache anale du dessus.

Antennes crénelées, palpes puissants, à dernier article droit.

Je possède un second exemplaire pris à El Monje près Loja, chez lequel les trois taches centrales et la partie médiane des supérieures sont lavées de blanc ; il possède en outre une tache blanche basilaire.

Loja et El Monje; deux ♂, 1891 et 1893.

Acanthodica Cabra n. sp.

50 millimètres. Port d'*Acanthodica Drucei* mihi. Dessus des premières ailes gris roussâtre, avec une petite tache plus clair à l'extrémité de l'apex. Les dessins sont fondus dans le fond et se composent d'une série de taches vert mousse, indiquant d'une manière plus ou moins marquée suivant les individus, la demi-ligne, l'extrabasilaire, la coudée et la subterminale (ces deux dernières au

moyen d'une série de taches nervurales). Nervure médiane teintée de vert mousse. L'espace basilaire possède un point noir central, une double tache noire au bord interne, suivie d'une fine ligne noire entrecoupée. La coudée est accompagnée d'une série de traits noirs; enfin la côte est longée de points noirs internervuraux. Frange rousse tachetée de noir.

Dessus des inférieures gris pâle au centre, noirâtre le long du bord terminal et avec les nervures bien indiquées. Frange roussâtre.

Dessous des premières ailes gris brun brillant avec la tache apicale et la frange plus pâles; dessous des inférieures blanc au centre, fauve le long de la côte et du bord terminal, traversé au centre par une double ligne de petites taches partiellement indiquées et marqué de diverses taches noires terminales. Frange fauve. Antennes crénelées. Corps brun avec l'anus fauve.

Loja; quatre ♂, 1890 à 1892.

Callopistria? Trespuntada n. sp.

29 millimètres. Premières ailes à bord terminal bien coudé à la 3. Dessus des supérieures brun foncé, taché de ferrugineux et de noirâtre, traversé par deux fines lignes lilacées (une extrabasilaire arrondie et une extracellulaire coudée). Entre ces deux lignes se trouvent trois petits points cellulaires blancs, disposés en triangle. Côte blanchâtre à la base, bord interne lilacé, nervures finement saupoudrées de lilacé. Frange concolore. Dessus des inférieures brun, avec une tache ferrugineuse à l'angle anal et la frange blanchâtre en partie.

Dessous des quatre ailes brun marron, semé d'écailles et de poils pâles à la côte et dans les franges, la tache anale des inférieures reparaissant plus pâle.

Antennes courtement pectinées, dessus de l'abdomen crèté, brun foncé ainsi que le thorax; palpes courts, poilus, de teinte ferrugineuse. Seconde et troisième paires de pattes avec les tarses garnis d'une grosse touffe de poils couchés à la seconde paire, en brosse à la troisième.

Un ♂, El Monje près Loja, 1893.

Melipotis Lenosa n. sp.

41 millimètres. Dessus des quatre ailes de teinte ligneuse, finement strié de brun; les supérieures traversées par une fine ligne extrabasilaire noire, bordée intérieurement de blanchâtre, plus écartée à la côte qu'au bord interne, et par une extracellulaire

également noire, bordée intérieurement de brun, extérieurement de blanchâtre, coudée en dehors à la hauteur de la cellule. Entre ces deux lignes un petit point cellulaire; enfin ces ailes possèdent plusieurs petits points terminaux placés entre les nervures.

Dessus des inférieures traversé par une ligne semblable et faisant suite à l'extracellulaire des premières ailes; cette ligne aboutit au bord abdominal un peu au dessus de l'angle anal. Franges concolores.

Dessous des premières ailes gris blond, la partie interne blanchâtre, la côte coupée de taches plus claires et la frange concolore. Ce dessous possède un point cellulaire et une rangée de points subterminaux, à peine marqués. Dessous des inférieures blanchâtre, semé d'atomes gris avec une large tache centrale brune et une rangée de points subterminaux bien marqués. Ces points sont posés sur les nervures et se transforment en ligne de la 4e au bord abdominal. Franges concolores. Palpes courts, poilus, à dernier article tronqué; antennes filiformes; tête, corps et pattes couleur du fond.

Un ♂, El Monje près Loja, 1893.

Dyops Schausii n. sp.

68 millimètres. Dessus des supérieures fauve pâle traversé par une large bande brune, droite, qui de la base de la côte va droit au bord terminal où elle aboutit en dessous de l'apex. Dans ces deux premiers tiers, la côte est coupée de quatre lignes brunes, sinueuses, qui vont se perdre dans la bande terminale.

Bord interne brunâtre. Une double ligne subterminale peu distincte, enfin une série de petits points noirs subterminaux entre les nervures, bien marquées entre la sous médiane et la 1. Frange concolore.

Dessus des inférieures rayé de noir dans la première moitié, puis traversé par une bande fauve, suivie d'une bande brune, le bord terminal et la frange paille. L'œil particulier à cette famille est placé le long du bord terminal entre la 4 et la 3, il est noir avec un trait blanc.

Dessous des quatre ailes jaunâtre, bordé d'une série de taches subterminales rousses, le centre des supérieures envahi par une ombre rousse.

Antennes filiformes ; dessus et dessous du corps en harmonie de ton avec les ailes.

Un ♂, El Monje près Loja, 1893.

Ophthalmophora Bellaoides n. sp.

38 millimètres. Cette espèce au premier coup d'œil ressemble tout à fait à l'*Ophthalmophora Bella* Btl. figuré dans la Biologia Centrali-Americana, pl. 50, fig. 23. Elle s'en distingue par sa taille et surtout par la bande blanche, qui, après avoir traversé la base des inférieures, passe sur les supérieures. Celle-ci, dans *Bella*, coupe le bord interne plus près de la base et reste droite pour aboutir vers le bord terminal entre la 3 et la 2. Dans *Bellaoides*, au contraire, la bande blanche ne passe sur les supérieures que vers le milieu du bord interne, s'arrondit après avoir traversé la sous médiane et disparaît sans atteindre la 4. En outre le bord terminal des supérieures est taché de soufre de la 4 à l'angle interne. Le reste des supérieures est gris blond, blanchâtre le long de la côte et avec l'indication de deux lignes transversales fondues dans le fond. Frange blanche et grise. Les inférieures sont grises à la base. L'œil est noir, pupillé d'argent et cerclé de soufre; la ligne qui l'entoure extérieurement, comme dans *Bella*, est argentée. Extérieurement à cette ligne, l'aile est soufre, le bord terminal plus jaune toutefois dans sa seconde moitié. Intérieurement l'aile est d'un blond roux.

Dessous des supérieures grisâtre avec l'apex et l'angle interne blancs et une large bande subterminale enfumée.

Dessous des inférieures blanc avec une bande subterminale enfumée plus large dans sa première moitié.

Palpes courts, droits; antennes filiformes.

Un ♂, El Monje près Loja, 1893.

Cidaria Flavolimbarioides n. sp.

Taille et port de *Cidaria Flavolimbaria* de Maassen (Stübel Reise in Sud Amerika, pl. 9, fig. 6) avec laquelle cette espèce pourrait se confondre à première vue. On l'en distinguera aisément d'abord par la bande médiane des supérieures, qui, dans *Flavolimbaria* se termine en pointe fermée sur le bord interne tandis que dans *Flavolimbarioides* cette même bande arrive largement ouverte au même bord; ensuite par le dessous des ailes, qui, dans l'espèce de Maassen, est d'une teinte unie, possède aux supérieures une ligne blanche assez allongée et aux inférieures à peine une ligne centrale mal dessinée, tandis que *Flavolimbarioides* n'a, à la place de la ligne blanche, qu'un point blanc à la côte mais, par contre, est ornée aux secondes ailes de deux lignes arrondies parallèles (quelques exemplaires possèdent même une troisième ligne intermédiaire) et d'une ombre terminale.

Le dessus des premières ailes est d'un vert mousse, les dessins ressortant en noir; la bande médiane, arrondie extérieurement, est bordée à l'intérieur d'un espace vert à peu près droit; cette bande est plus large que dans *Flavolimbaria* et parcourue à l'intérieur de diverses lignes noires zigzaguées; le trait apical est vert et non blanc.

Le dessus des inférieures est à peu près le même dans les deux espèces, la partie jaune coupée peut-être plus droit dans *Flavolimbarioides;* toutefois ce caractère me semble devoir être fort variable, et je possède un spécimen envahi de mélanisme, dans lequel la partie jaune est réduite à une petite éclaircie apicale, toute l'aile étant d'un noir profond.

De Loja j'ai reçu deux ♂ et une ♀ de *Cidaria Flavolimbaria* bien typiques; dans la ♀ les inférieures sont envahies par le jaune et ces ailes ne sont noires qu'à l'apex, à l'angle anal et légèrement à la base. Je ne possède malheureusement aucune ♀ de *Flavolimbarioides* et j'ignore si elle présente la même particularité.

Loja, El Monje et Zamora; 6 ♂, l'individu venant de Zamora pris en juin 1893.

Supplément au « *CATALOGUS COLEOPTERORUM* » de Gemminger et Harold, Vol. V, 1869,

par Ed. Fleutiaux.

TRIXAGIDAE.

Throscides gallo-rhénans, Fauvel, Rev. d'Ent., IV, 1885, p. 332.

Throscides de l'Amérique centrale, Dr Horn, Biol. Centr. Am., Col., III, 1890, p. 193.

Throscidae et Buprestidae, dist. caract., Dr Horn, Tr. Am. Ent. Soc., XVIII, 1891, p. 46.

Trixagus Kug. (*Throscus* Latr.)

Espèces d'Allem., Kraatz, B. E. Z., XV, 1872, p. 141.

Not. caract. sex., Fauvel, Rev. d'Ent., VII, 1888, p. 69.

Not. caract. sex. et tabl. esp. eur., Reitter, Wien Ent. Zeit., VIII, 1889, p. 35.

auctus Dr Horn, Biol. Centr. Am., Col., III, 1890, p. 207. Panama.

Bonvouloiri Steinh., Atti Soc. ital., 1874, p. 566. San Luis.